

SOP Händedesinfektion

Zweck

Diese SOP dient der Umsetzung der Hygienerichtlinie Standardhygiene, persönliche Hygiene und Händehygiene.


Geltungsbereich

Ordination

Durchführende/r und Verantwortliche/r

- Sämtliches Personal

Indikation



Ablauf

3 ml eines alkoholischen Desinfektionsmittels (Wandspender 3 x betätigen) werden unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben. (z.B. Sterillium med)
Standard-Einreibemethode gemäß EN 1500.

1. Schritt: Handfläche auf Handfläche
2. Schritt: Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken

3. Schritt: Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern
4. Schritt: Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit verschränkten Fingern
5. Schritt: Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt
6. Schritt: Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt

Besondere Hinweise

- An Händen und Unterarmen dürfen keine Schmuckstücke, Uhren oder Ringe getragen werden.
- Es wird empfohlen, dass Fingernägel wegen der Gefahr einer Handschuhperforation die Fingerkuppe nicht überragen.
- Es darf kein Nagellack sowie Kunstnägel getragen werden.
- Die Hände bis zu den Handgelenken werden über die Einwirkzeit feucht gehalten, ggf. mehrmalige Entnahme von Händedesinfektionsmittel.



Mitgeltende Dokumente

(in der jeweils gültigen Fassung)

- HYGR Standardhygiene
- HYGR Persönliche Hygiene
- HYGR Händehygiene